ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

外用消炎鎮痛液剤／刺激じんわりタイプ

新トクホンチール

新トクホンチール

第3類医薬品

⚠ 使用上の注意

【してはいけないこと】

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる）

1．次の部位には使用しないこと
　1)目の周囲、粘膜など
　2)湿疹、かぶれ、傷口

【相談すること】

1．次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
　・薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
2．使用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛みなどの症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
3．5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能又は効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

【用法及び用量】

適量を１日数回患部に塗布してください。

1．小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。また、刺激が強く感じられることがあるため、13 歳未満の人への使用はさけてください。
2．目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐ水又はぬるま湯でよく洗い、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
3．外用にのみ使用し、内服しないでください。
4．入浴の１時間前には使用しないでください。使用直後に入浴すると強い刺激を感じることがあります。
5．皮膚の弱い人は同じ所に続けて使用しないでください。
6．使用前に腕などに少量を塗布し、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛みなどの症状がおきないことを確かめてから使用してください。
7．塗布した所はよく乾かしてください。乾かないうちに衣類などが触れると、変色することがありますので注意してください。
8．強い刺激を感じた場合には、よく泡立てた石鹸でやさしく患部を洗い流し、その後よく冷やしてください。

※ボトルの塗布面で肌を軽くたたき、薬液をしみ込ませてから使用してください。
　使用後は、必ずキャップを閉めてください。

【成分及び分量】

有効成分　100mL 中

l-メントール……6.0g
サリチル酸グリコール……3.0g
ビタミン E 酢酸エステル　……0.5g
クロルフェニラミンマレイン酸塩……0.1g
ノニル酸ワニリルアミド……12mg

添加物としてアルコール、ハアセチルしょ糖、プロピレングリコール、水を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

①小児の手の届かない所に保管してください。
②直射日光をさけ、キャップを閉めて涼しい所に保管してください。
③誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
④本剤配合のアルコールなどは、プラスチック製品や家具・調度品などの塗装を傷つけることがありますので、薬液がつかないよう注意してください。
⑤使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
⑥火気に近づけないでください。
火気厳禁
第二石油類　危険等級Ⅲ

大正製薬(株) お客様 119 番室
電話　　03-3985-1800
受付時間 8:30～21:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度
0120-149-931

発売元
大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号
http://www.taisho.co.jp

製造販売元
株式会社トクホン
東京都港区芝2-28-8

――本文は、直接外箱に記載されている事項です――